



Chef S vét du cen comp S vét et animaux A

3000 Berne 22, le 24 février 2011

« SERVICE DE SOINS VETERINAIRES »

## **Notice concernant des médicaments à administrer aux chevaux**

### **1 Bétadine en pommade**

Onguent vulnéraire, pommade pour la peau

#### **1.1 Indications**

- Plaies cutanées de tous genres ;
- Brûlures.

#### **1.2 Posologie / mode d'emploi :**

- Appliquer la pommade 1 à 3 fois par jour à l'endroit concerné.

#### **1.3 Remarques particulières :**

- Eventuellement ajouter un pansement ;
- En cas de refroidissement, réchauffer éventuellement à la température ambiante.

### **2 Cortivet**

Pommade à base de cortisone pour la cicatrisation d'une plaie

#### **2.1 Indications**

- Maladies aiguës et chroniques de la peau avec production inflammatoire non spécifique de bactéries et de champignons.

#### **2.2 Posologie / mode d'emploi :**

- Appliquer deux fois par jour une mince couche en couvrant bien la plaie ;
- La pommade doit être utilisée pendant au maximum une semaine.

#### **2.3 Remarques particulières :**

- Pas approprié pour un traitement de longue durée de maladies de la peau non spécifiées ;
- Pas approprié pour des plaies infectées.

### **3 Bétadine sous forme de savon liquide (flacon brun)**

Savon désinfectant

#### **3.1 Indications**

- A tous les endroits où l'on souhaite un nettoyage en plus de la désinfection :
  - Désinfection des mains ;
  - Désinfection de plaies.

#### **3.2 Posologie / mode d'emploi :**

- Nettoyer l'endroit souhaité en ajoutant un peu d'eau.

#### **3.3 Remarques particulières :**

- Rincer soigneusement après le nettoyage avec le savon.

### **4 Bétadine en solution (flacon vert)**

Solution désinfectante

#### **4.1 Indications**

- Désinfection des mains, de plaies et de modifications cutanées.

#### **4.2 Posologie / mode d'emploi :**

- Appliquer la solution non diluée à l'endroit souhaité.

#### **4.3 Remarques particulières :**

- Pour bande de contention : diluer 1:10.

### **5. Equimax**

Médicament de déshelminthisation à large spectre agissant contre les vers ronds et les vers solitaires

#### **5.1 Indications**

- Traitement des infestations de nématodes adultes et immatures (vers ronds), cestodes (vers solitaires) et larves de mouches du varron (*Gasterophilus* spp.) chez les chevaux.

#### **5.2 Posologie / mode d'emploi :**

- 1 doseur oral par cheval.

#### **5.3 Remarques particulières :**

- Noter la date de la déshelminthisation ;
- Ne pas toujours vermifuger avec la même préparation (résistances !).

## **6 Acétylcystéine**

Agent mucolytique

### **6.1 Indications**

- L'acétylcystéine est utilisée pour toutes les maladies des voies respiratoires entraînant une formation excessive de sécrétions visqueuses qui ne peuvent pas être expectorées ou le sont de manière insuffisante.

### **6.2 Posologie / mode d'emploi :**

- 2 fois par jour 2 g dans le fourrage.

### **6.3 Remarques particulières :**

- Aucune.

## **7 Benamin**

Sirop antitussif

### **7.1 Indications**

- Toux sèche, crampes bronchiques (asthme), inflammations des conduits respiratoires, du larynx et du pharynx.

### **7.2 Posologie / mode d'emploi :**

- 30 ml 2 fois par jour.

### **7.3 Remarques particulières :**

- Lors de maladies des voies respiratoires, le médicament ne doit pas être utilisé s'il y a formation excessive de sécrétions visqueuses, car cela peut entraîner la formation d'un abcès dans le poumon.

## **8 Butasan**

Pâte analgésique, antiphlogistique, antipyrétique et antirhumatismale

### **8.1 Indications**

Enflures inflammatoires et maladies douloureuses inflammatoires de l'appareil moteur telles que :

- Fourbure aiguë ;
- Arthrite, périarthrite, polyarthrite ;
- Abcès, eczémas, brûlures ;
- Contusions, distorsions, luxations, déchirures musculaires ;
- Tendinite, bursite, tendovaginite, myosite, spondylite ;
- Myalgie rhumatoïde et maladies rhumatoïdes.

### **8.2 Posologie / mode d'emploi :**

- 3 à 6 ml par jour.

### **8.3 Remarques particulières :**

- Ne pas appliquer aux chevaux ayant des ulcérations au tube digestif ;
- Délai d'attente de 6 mois.

## **9 Imaverol**

Antifongique

### **9.1 Indications**

- Eruptions cutanées.

### **9.2 Posologie / mode d'emploi :**

- 40 ml (3 cuillères à soupe) d'Imaverol™ et 2 litres d'eau ;
- Le cheval doit être entièrement lavé ;
- Répétition après 4 jours.

### **9.3 Remarques particulières :**

- Les mycoses cutanées peuvent également être transmises à l'homme. Il faut donc porter des gants lors du traitement.

## **10 Rota TS poudre / pâte**

Antibiotiques

### **10.1 Indications**

- Infections bactériennes

### **10.2 Posologie / mode d'emploi :**

- 30 g/ml par jour dans le fourrage / la bouche.

### **10.3 Remarques particulières :**

- Délai d'attente de 7 jours.

## **11 Gel vert**

Pommade analgésique

### **11.1 Indications**

- Douleurs aux articulations et aux muscles ;
- Arthrite ;
- Hématome ;
- Névrite.

### **11.2 Posologie / mode d'emploi :**

- Frotter deux à trois fois par jour pendant plusieurs jours.

### **11.3 Remarques particulières :**

- Eviter le contact visuel.

## 12 **Métacam**

Anti-inflammatoire non stéroïdien

### 12.1 **Indications**

- Atténuation d'inflammations et de douleurs lors de maladies aiguës et chroniques de l'appareil moteur.

### 12.2 **Posologie / mode d'emploi :**

- 1 fois par jour pour 500kg pour 14 jours au maximum.

### 12.3 **Remarques particulières :**

- Il n'est pas recommandé d'administrer avec des glucocorticoïdes, d'autres médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens ou des anticoagulants ;
- Délai d'attente de 3 jours.

## 13 **Tobrex**

Pommade ophtalmique antibiotique

### 13.1 **Indications**

- Conjonctivite **avec** lésion de la cornée.

### 13.2 **Posologie / mode d'emploi :**

- 2 fois par jour dans la paupière inférieure.

### 13.3 **Remarques particulières :**

La pommade ne peut être utilisée que pour un cheval.

## 14 **TobraDex**

Pommade ophtalmique antibiotique contenant de la cortisone

### 14.1 **Indications**

- Conjonctivite **sans** lésion de la cornée.

### 14.2 **Posologie / mode d'emploi :**

- 2 fois par jour dans la paupière inférieure.

### 14.3 **Remarques particulières :**

La pommade ne peut être utilisée que pour un cheval.

## **15 Lotagen Gel**

Onguent vulnérable

### **15.1 Indications**

- Plaies cutanées ;
- Plaies fraîches, infectées ou qui se cicatrisent mal ;
- Abscesses, eczémas, brûlures.

### **15.2 Posologie / mode d'emploi :**

- Enduire de pommade 2 à 3 fois par jour l'ensemble de l'endroit concerné ;

### **15.3 Remarques particulières :**

Eventuellement ajouter un pansement.

tierarzt.lvblog@vtg.admin.ch

079 407 84 11